

クラミジア・マイコプラズマ性病に

アジスロマイシン250mg

1回4錠 4,000円

アジスロマイシンはマクロライド系抗菌薬であり、クラミジアやウレアプラズマ、一部のマイコプラズマによる尿道炎の症状に効果があります。
また、喉頭炎や肺炎など様々な細菌性感染症でも使用されます。

服用方法

尿道炎に対し、1回4錠（計1000mg）飲みきりとなります。

服用後1週間経過しても症状が改善しない場合は、耐性を持った細菌やその他の細菌による感染症の可能性があるため、必要に応じ精査を行った上で治療するようにしてください。

副作用・注意点

主な副作用として、一般的なアレルギー症状の他（かゆみ、発疹等）むくみや下痢などがあげられます。

また頻度は極めて低いものの、起こりうる重大な副作用として重篤な皮膚病変や血球異常などがあげられます。

妊娠中や授乳中、過去にアジスロマイシンの内服で大きな副作用が起こったことがある方は服用することが出来ません。

また、肝機能障害や心疾患がある方は服用に注意が必要です。

一部の薬剤については、併用により効果が減弱あるいは増強する可能性があります。

現在治療中の疾患や服用中の薬剤、今まで大きな病気にかかったことがある方は必ず事前に相談して下さい。

新しい性感染症予防「Doxy PEP」

Doxy PEPとは

梅毒、淋病、クラミジアなどは感染力の高い性感染症として知られており、陽性の方との性行為により梅毒は30%程度、淋病・クラミジアは50%感染するという報告があります。

感染リスクの高い性行為後72時間以内に**ビブラマイシン**（ドキシサイクリン）という抗生剤を内服することにより、**梅毒、淋病、クラミジアなどの性感染症を一定の割合で予防することができる新しい性感染症予防法**です。

予防効果

梅毒・クラミジアは約90%、淋病は約60%程度予防できるといわれています。

不特定多数との性行為や風俗など、

リスクの高い性行為の後で感染が心配な方におすすめの予防法となっております。

ビブラマイシン

1回分 2,200円 5回分 6,600円 10回分 9,900円

服用方法

性行為後72時間以内に1回2錠（200mg）飲み切りにて服用してください。

副作用

腹痛・下痢・吐き気などの消化器症状、頭痛、倦怠感などが主な副作用です。
ほとんどは自然に改善します。

注意点

過去に本剤服用でアレルギーを起こしたことがある方、肝機能障害のある方、
妊娠中・授乳中の方は服用することができません。

一部のお薬とは飲み合わせによって効果に影響を及ぼすものがありますので、必ず服用しているお薬を申告するようにしてください。

漫然と投与すると薬が効きにくい細菌が出てくる可能性があります（耐性化）。
本薬剤を服用しても100%予防できるものではないため、
疑わしい症状を認めた場合は適切な検査・治療を受けるようにしてください。

気になる事があれば、
公式LINEでいつでも医師にご相談ください

