

※税込表示

ED治療

バイアグラ25mgODフィルム 10枚 11,000円・20枚16,000円

バイアグラ50mgODフィルム 10枚 15,000円・20枚18,000円

シルデナフィル50mg 10錠 12,000円・20錠15,000円

カマグラゼリー 1箱7袋 8,800円

タダラフィル10mg 10錠 12,000円・20錠16,000円

タダラフィル20mg 10錠 16,000円・20錠22,000円

ED治療とは？

EDとは、勃起機能の低下（勃起不全）のことです。全く勃起しない状態は重度のEDになるため、実際には多くありません。硬さが不十分、勃起状態が維持できないなど、満足な性交が行えるだけの勃起が得られないという場合もEDの症状に該当するのです。

年齢を重ねるほどにEDは誰もがなり得る症状で、成人男性の4人に1人、50代以上の男性では2人に1人もその人がEDを有すると言われております。

しかし、年齢のせいだけではないというデータもあり、不健康な生活習慣などにより若年層のED患者も増えています。

「人に相談するのは恥ずかしく、抵抗がある」「薬に頼って良いのか分からない」と治療に進めない方も多くみられます。プライバシーの守られているオンライン診療で、是非ED治療を受けてみましょう。

バイアグラODフィルム・シルデナフィル カマグラゼリー

服用方法

性行為の30分～1時間前に服用します。

- ・バイアグラはOD錠のため水なしで服用可能です。
 - ・シルデナフィルは、コップ1杯程度の水またはぬるま湯と一緒に飲むようにしてください。
 - ・ゼリーの場合は初めは1/4袋～1/2袋からの開始を推奨
食後に服用すると効果が減弱するため、空腹時に服用する必要があります。もしくは食事から2時間程度空けて内服することが推奨されています。
- 万が一、食後に服用する場合は、あっさり目の食事メニューを選び、腹六分目に抑えるようにしましょう。

持続力

持続力は3～5時間程度で、ピークは内服から1～2時間後です。

バイアグラODフィルムとは？

バイアグラODフィルムとは、バイアグラの新しいタイプの薬で、従来の錠剤とは異なって薄いフィルム状の形状です。

口に含むと溶けるため水を飲まずに服用することが出来るため、サッと飲みやすい！
錠剤と同じ有効成分を同量含むため効果は同等！

何よりも携帯性にずば抜けて優れていることから根強い人気があり、名刺入れや財布に入る携帯性の良さで持ち運びが非常に楽と好評です。



タダラフィル

タダラフィルは、他のED治療薬に比べ、効果の持続時間が圧倒的に長いという点がメリットとして挙げられます。射精後には自然に勃起状態がおさまりますが、効果の持続中は性的刺激や興奮を受ければ何度でも勃起状態にすることが可能です。そのため、中折れ改善効果も期待できます。また勃起時の硬さが硬くなりやすい特徴があり、「自然な感じの勃起になる」と満足される方も多いです。

持続力と服用方法

服用後1～2時間程度で効き始め、20～36時間と長く効果が持続します。そのため、性行為の直前に服用いただく必要はなく、またバイアグラと違って食事による影響を受けませんので、空腹時、食前、食後のタイミングを気にすることなくいつでも服用できます。

ED薬を服用出来ない方

脳出血、脳梗塞、心筋梗塞の既往歴がある(6か月以内)

- ・ 肝臓に重い障害がある
- ・ 腎臓に重い障害がある
- ・ 心血管系の障害がある
- ・ 成分に対し過敏症の既往歴のある患者 など

性行為中は血管や心臓への負担が大きくなるため、疾患の悪化を招く恐れがあります。脳の疾患や心筋系・血管系の病気がある方は服用を避けましょう。

ED薬の副作用

・ 顔のほてり・頭痛・動悸・鼻詰まり・目の充血・血管拡張による血圧低下 など
副作用の症状は一過性であり、男性器への血流が豊富になると緩和されることが多いです。そのため、時間をおいて副作用が治まるのを待ちましょう。

しかし、ED治療薬に起こる特異な副作用として以下のようなものもあります。

- ・ プリアピズム(勃起持続症)
- ・ 非動脈炎性前部虚血性神経症(NAION)

プリアピズム（勃起持続症）は4時間以上痛みを伴う勃起が続く症状です。
このような症状が見られた場合はすぐに医療機関へ受診してください。

Q. ED薬を飲むと常に勃起状態ですか？

性的な刺激があった時のみ薬の効果が作用し、勃起が起こります。ずっと勃起状態が続いているということはありません。

性的刺激を受けて初めて勃起し、性的刺激が中止されれば（性的行為が終了すれば）勃起はおさまります。

Q. ED薬を飲むと興奮しやすくなりますか？

性的な興奮を高める薬ではありません。また、催淫効果・媚薬効果もありません。

早漏治療

| | | |
|-------------|-----|--------|
| ダポキセチン 30mg | 10錠 | 9,000円 |
| ダポキセチン 60mg | 10錠 | 9,500円 |

ダポキセチンは、早漏（早発射精）の治療に使用される薬です。脳内の神経伝達物質であるセロトニンに作用し、射精を遅らせ、性的パフォーマンスのコントロールを向上させます。

保管方法：高温多湿を避け、室温で保管してください。
子供の手の届かない場所に保管しましょう。

ダポキセチンの特徴

- 射精を遅らせる効果で、性的活動中のコントロール感が改善されます。
- 効果は一時的で、服用後約1～3時間でピークを迎えます。
- 必要な時に服用する「頓服薬」として使用され、継続的な服用は不要です。

服用方法

- 1回30mgが通常の初回投与量です。
効果が不十分な場合は、医師の判断で60mgに増量することがあります。
- 性的活動の1～3時間前に服用してください。
- 服用間隔は24時間以上空けるようにしましょう。
- 水と一緒に服用してください。食事に影響されないため、食後・食前のどちらでも服用可能ですが、アルコールとの併用は避けてください。

副作用

よくある副作用：吐き気、頭痛、めまい、下痢

《稀に起こる重篤な副作用》

- 失神（特に座ったり立ち上がったりの急なめまい）
- 不整脈（心拍の異常）
- 気分の落ち込みや不安感

これらの症状が見られた場合は、すぐに服用を中止し、医師に相談してください。

注意点

- アルコールとの併用は、めまいや失神のリスクを高めるため避けてください。
- 自動車の運転や危険な機械の操作は、服用後めまいや疲労感が出た場合には控えてください。
- 他の医師や薬剤師に相談する際は、ダポキセチンの服用について必ず伝えてください。

服用ができない人

次のような方は、ダポキセチンの服用を避けてください。

- **重度の心臓病（心不全や重度の不整脈など）**の方
- 重度の肝機能障害をお持ちの方
- うつ病や双極性障害の既往歴がある方
- MAO阻害薬を現在使用している方
- 中等度以上の腎機能障害がある方
- 過去にダポキセチンに対するアレルギーがあった方

また、以下のお薬を服されている方はダポキセチンの服用を避けてください。

- MAO阻害薬（例：セレギリン、イソカルボキサジド）：セロトニン症候群のリスクがあるため、併用は禁忌です。
- チオリダジン（抗精神病薬）：重篤な心血管副作用のリスクがあるため、併用は避けてください。
- リネゾリド（抗生物質）：セロトニン症候群のリスクを高めます。
- SSRI/SNRIなどの抗うつ薬：ダポキセチンと同様の作用を持つため、併用によりセロトニン症候群のリスクが高まる可能性があります。
- CYP3A4阻害薬（ケトコナゾール、リトナビルなど）：ダポキセチンの血中濃度が上昇し、副作用のリスクが高まるため、併用は慎重に行います。
- 抗不整脈薬（アミオダロンなど）：心臓に影響を与える薬と併用することで、心血管リスクが高まる可能性があります。