

脇汗の量が多く服の汗シミが気になる方、  
緊張で汗が止まらない方、脇汗による体臭が気になる方

拭き取りタイプ

ラピフオートワイプ

28包 15,000円

脇に塗るタイプ

エクロックジェル

1本2週間分 8,000円

脇汗はエクリン汗腺という種類の汗腺から、交感神経から出る

アセチルコリンと呼ばれる神経伝達物質の刺激によって分泌されます。

上記薬を塗布することでアセチルコリンによる刺激をブロックし、過剰に出る汗を止めます。

## ラピフォートワipesの使い方

1日1回、以下の手順でワipes1枚を用いて両脇に1回使いきりで塗布します。

①脇をタオルでふく等して、清潔で乾いた状態にしてください、使用する直前にラピフォートワipesを開封します（薬液が飛ばないように目から離して開封してください）。


②広げたワipesで脇を一拭きして塗布します。同じワipesでもう片方の脇も同様に塗布します。

③他の方が誤って触れることがないように注意して廃棄してください。

④使用後は必ず直ちに手を洗い、手に付着した薬液をきれいに洗い流してください。

※ゴシゴシこするように塗布したり、脇以外の部位への塗布はしないようにしてください。

※お薬に触れた手で絶対に目を触らないでください。羞明（光をまぶしく感じる）、散瞳（目がかすむ）、刺激感などの症状が現れることがあります。万が一目に入った場合は、すぐに水でよく洗い流してください。



## エクロックゲルの使い方

1日1回、適量をわきに塗布します。

具体的な使用方法は使用説明書を同封しますので、そちらをご参照ください。



## ラピフォートワイプ・エクロックゲルの注意点

緑内障、前立腺肥大症をお持ちの方、妊娠中・授乳中の方、過去に本剤の使用でアレルギーなど大きな副作用が起こったことがある方などは使用することができません。

現在治療中の疾患や服用中の薬剤、今まで大きな病気にかかったことがある方は必ず事前に相談するようにしてください。



## ラピフォートワイプの副作用

主な副作用として、羞明（光をまぶしく感じる）、散瞳（目がかすむ）、皮膚炎、かゆみ、湿疹、口渇感などが報告されています。

また、まれに高温や運動時などの場面で、発汗が抑制されることで体温が上昇し熱中症の症状が現れる可能性が考えられます。その場合は涼しい場所へ移動する、体を冷やすなどして体温を下げ、水分・塩分を補給するようにしてください。

## エクロックゲルの副作用

主な副作用として、皮膚炎、紅斑、かゆみ、湿疹、口渇感などが報告されています。

気になる事があれば、  
公式LINEでいつでも医師にご相談ください

